



**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению вирусвакцины сухой культуральной ВНИВИП против  
вирусного энтерита гусей

(Организация – разработчик: ГНУ ВНИВИП Россельхозакадемии,  
г.Санкт-Петербург)

**I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1. Вирусвакцина сухая культуральная ВНИВИП против вирусного энтерита гусей .

2. Лекарственная форма - лиофилизированная масса. Вирусвакцина изготовлена из культуральной жидкости культуры фибробластов эмбрионов гусей, инфицированных аттенуированным вирусом энтерита гусей («Клон 6» штамма «П-75») с добавлением стабилизаторов - сахарозы (10%), желатина ( 1 %) и пептона (4%), а также консервантов - бензилпенициллина (100 ЕД/см<sup>3</sup>) и стрептомицина сульфата (100мкг/см<sup>3</sup>).

По внешнему виду вирусвакцина представляет собой сухую однородную пористую массу бледно-розового или бледно-желтого цвета, легко растворимую в воде.

Вирусвакцина расфасована по 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 прививочных доз (3,0 -9,0 см<sup>3</sup>) в стеклянные флаконы соответствующей вместимости. Флаконы вакуумированы или заполнены инертным газом, герметично укупорены резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.

3. Флаконы с вирусвакциной упакованы в картонные коробки. В каждую коробку вкладывают инструкцию по применению вакцины.

Срок годности вирусвакцины 12 месяцев с даты выпуска при соблюдении хранения и транспортирования. По истечении срока годности вирусвакцина к применению не пригодна.

4. Вирусвакцину хранят и транспортируют в сухом темном месте при температуре 2 - 6°C. Допускается хранение при любой температуре ниже 0°C.

5. Вирусвакцину следует хранить в местах, недоступных для детей.

6.Флаконы с вирусвакциной без этикеток, с истекшим сроком годности, с нарушением целостности и/или герметичности укупорки, с измененным цветом и/или консистенцией содержимого, с наличием посторонних примесей, а также остатки вакцины, не использованные в течение 4 часов после вскрытия флаконов, подлежат выбраковке и обеззараживанию путем кипячения в течение 30 минут или обработки 2% раствором щелочи или 5% раствором хлорамина (1:1) в течение 30 мин.

Утилизация обеззараженной вирусвакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

## П. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

7. Вирусвакцина вызывает формирование иммунного ответа к вирусному энтериту у гусят через 10 дней после однократного, а у взрослого поголовья - через 21 день после двукратного применения, который сохраняется в течение 4-6 месяцев.

Одна иммунизирующая доза содержит не менее 5,0 lg ТЦД<sub>50/см<sup>3</sup></sub> вируса энтерита гусей («Клон-6» штамма «П-75»).

Вирусвакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

## III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. Вирусвакцина предназначена для профилактики вирусного энтерита гусей в неблагополучных по данной болезни гусеводческих хозяйствах (фермах, фермерских и подсобных хозяйствах).

9. Запрещается прививать клинически больных и/или ослабленных птиц. Противопоказанием для проведения вакцинации является наличие в хозяйстве остропротекающих инфекционных болезней птиц.

10. Вакцинации подлежат гуси родительского стада за 40-50 суток до начала сезона яйцевладки, двукратно с интервалом 20 суток.

Гусят, полученных от невакцинированных птиц родительского стада, вакцинируют в суточном возрасте и ревакцинируют перед яйцевладкой.

Гусят, полученных от вакцинированных птиц родительского стада, вакцинируют в 10-15- суточном возрасте и ревакцинируют перед яйцевладкой.

Вирусвакцину вводят внутримышечно (в область бедра) взрослым гусям в объеме 1,0 см<sup>3</sup>, а гусятам - 0,5 см<sup>3</sup>.

Содержимое флакона растворяют в стерильном физиологическом (0,9%) растворе из расчета 1,0 см<sup>3</sup> на одну дозу препарата.

Для введения вирусвакцины используют одноразовые шприцы и иглы или многоразовые, которые стерилизуют кипячением в течение 20 минут. Не допускается применение для стерилизации инструментов химических дезинфицирующих средств. Место введения вирусвакцины обрабатывают 70%-ным этиловым спиртом.

11. Симптомов проявления вирусного энтерита гусей или других патологических признаков при передозировке вирусвакцины не установлено.

12. Особеностей постvakцинальной реакции при первичной и вторичной иммунизации не установлено.

13. Следует избегать нарушений схемы проведения вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики вирусного энтерита гусей. В случае пропуска очередного введения вирусвакцины необходимо провести иммунизацию как можно скорее.

14. При применении вирусвакцины в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений не наблюдается.

15. Запрещается одновременное применение «Вирусвакцины сухой культуральной ВНИВИП против вирусного энтерита гусей» с другими живыми иммунобиологическими препаратами.

Химиотерапевтические средства применяют за 3-5 суток до вакцинации и через 5-7 суток после ее проведения.

16. Ограничений в использовании мяса и яиц от птиц, привитых вирусвакциной ВНИВИП против вирусного энтерита гусей нет.

#### IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

17. При работе с вирусвакциной следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения.

18. Все лица, участвующие в проведении вакцинации должны быть одеты в спецодежду (резиновые сапоги, халат, брюки, головной убор, резиновые перчатки) и обеспечены индивидуальными средствами защиты (очки закрытого типа). В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.

19. При попадании вирусвакцины на кожу и/или слизистые оболочки их рекомендуется промыть большим количеством водопроводной воды. В случае разлива вирусвакцины, зараженный участок пола или почвы заливают 5% раствором хлорамина или едкого натрия. При случайном введении препарата человеку, место введения необходимо обработать 70 % раствором этилового спирта, обратиться в медицинское учреждение и сообщить об этом врачу.

20. Организация-производитель: Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт птицеводства. (ГНУ ВНИВИП), 198412, г. Санкт-Петербург - Ломоносов, ул. Черникова, дом 48 Телефон/факс: (812)372-54-81.

Инструкция по применению лекарственного средства « Вирусвакцина сухая культуральная ВНИВИП против вирусного энтерита гусей» разработана организацией – производителем ГНУ ВНИВИП, 198412.г.Санкт-Петербург - Ломоносов, ул.Черникова, дом 48 тел/факс:(812) 372-54-80.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению «Вирусвакцины сухой культуральной ВНИВИП против вирусного энтерита гусей», утвержденная заместителем Руководителя Россельхознадзора 14 февраля 2014 года.

Рекомендовано к применению в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»  
Регистрационный номер 78-1-1.14-1823 Н173Р-1-1.2/00948