

03.02.2017

Бровадез-20
(розчин для дезінфекції)
листівка-вкладка

Опис

Прозорий злегка опалесцюючий безбарвний, або ледь жовтуватий розчин, піниться при збовтуванні, зі слабким специфічним запахом.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:
бензалконію хлорид - 200 мг.

Допоміжні речовини: вода дистильована.

Фармакологічні властивості

АТС –vet класифікаційний код: QV07AV Технічні дезінфектанти.

Препарат має бактерицидну та спороцидну дії по відношенню до грампозитивних і грамнегативних бактерій (*Brucella spp.*, *Clostridium spp.*, *E. coli*, *Klebsiella spp.*, *Listeria spp.*, *Proteus spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Bac. larvae*, *Bac. altei*) та фунгіцидну (*Aspergillus spp.*, *Candida albicans*, *Trichophyton spp.*, *Saccharomyces cerevisia*, *Ascosferius apis*) дії; володіє дезінвазійними властивостями відносно інвазійних елементів нематод та ооцист еймерій;

Робочі розчини не пошкоджують металеві предмети, фарбовані поверхні будівельних конструкцій, пластмаси та тканини.

Застосування

Засіб застосовують з метою санації та дезінфекції тваринницьких та птахівничих приміщень, в місцях реалізації продукції тваринництва та птахівництва (ринки), цехах по переробці м'ясних, молочних та інших продуктів тваринного походження; у забійних цехах та санітарно-забійних пунктах, конур, кліток та інших місць утримання дрібних тварин і птиці, особливо після їх дегельмінтизації, для знезараження вуликів, рамок та іншого обладнання та інвентарю на пасіках неблагополучних з аскоферозу, аспергільозу, парагнільцю, американського і європейського гнільцю та нозематозу бджіл; а також на інших об'єктах, що підлягають ветеринарному нагляду (для обробки обладнання, транспорту, технологічного обладнання, резервуарів, систем водопостачання, інструментів, інвентарю, санітарно-технічного обладнання, тощо).

Дозування

Дезінфекцію проводять після ретельної механічної та санітарної очистки поверхонь об'єктів знезараження.

Вологі дезінфекції проводять водними розчинами відповідної концентрації. Їх готують шляхом змішування препарату із не хлорованою водою. Наносяться розчини за допомогою дрібнодисперсних оприскувачів до повного зволоження або протиранням поверхні предметів губкою.

Розчини наступних концентрацій препарату використовують для:

- 0,1 % (10 мл/10 л води) – санації обладнання молокопереробних об'єктів, годівниць та поїлок в присутності тварин;
- 0,25 % (25 мл/10 л води) – профілактичної дезінфекції приміщень та інвентарю в присутності тварин; санації водопровідних систем;
- 0,5 % (50 мл/10 л води) – асептичного прибирання боєнь; переробних цехів; торгівельних; лабораторних приміщень; засобів транспортування продукції тваринницького походження; замочування спецодягу перед його пранням;
- 1,0 % (100 мл/10 л води) – планових дезінфекцій під час санітарних розривів в тваринницьких приміщеннях;
- 1,5 % (150 мл/10 л води) – дезінвазії після дегельмінтизації та знезараження місць утримання інвазійно хворих тварин чи птиці;
- 0,05 % (50 мл/100 л води) – запобіганню розмноження зелених водоростей та інших мікроорганізмів в закритих басейнах чи системах водопостачання. Такі обробки, з тижневим інтервалом, доцільно проводити систематично;

03.02.2017

– 2,5 % (25 мл/л води) – дезінфекції пасік неблагополучних щодо особливо небезпечних хвороб бджіл. Їх проводять при температурі повітря понад 12°C за допомогою оприскувачів (типу “Росинка”). При цьому добре зволожують усі поверхні вуликів, інвентарю пасік та рамок (з яких попередньо відкачують мед). Оброблені предмети щільно закривають поліетиленовою плівкою і витримують 10-12 годин. Опісля, всі предмети промивають водою і висушують. Таким же чином, але 1,5% розчином (15 мл/л води) проводять планово-профілактичні дезінфекції на вільних та умовно вільних від інфекцій пасіках.

– 0,5 % розчином (5 мл/л води) на благополучних пасіках 2 рази на рік (при весняних і осінніх ревізіях), протирають зволоженою губкою всі зовнішні та доступні внутрішні стінки вуликів і дерев’яні частини рамок.

Протипоказання

Мило та мийні дещо знижують активність препарату.

Застереження

Не застосовувати в присутності тварин, птиці та бджіл.

Розчини понад 2% концентрації можуть викликати подразнення шкіри, тому, при роботі з препаратом та його розчинами необхідно користуватись засобами індивідуального захисту: рукавицями з поліхлорвінілу та захисними окулярами.

Приготування робочих розчинів проводити в провітрюваному приміщенні, де є вода.

Під час роботи з препаратом забороняється приймати їжу, пити, курити.

Після закінчення роботи обличчя і руки слід вимити водою з милом.

У разі потрапляння препарату в очі, їх промивають великою кількістю води і закачують 20 % розчином сульфацилу натрію (альбуциду).

У разі випадкового потрапляння препарату на шкіру, потрібно ретельно промити уражену ділянку проточною водою, після цього змастити шкіру пом’якшуючим кремом.

Форма випуску

Флакони з полімерних матеріалів по 20, 50, 100, 200, 500, 900 або 1000 мл, пластикові каністри по 5 або 10 л.

Зберігання

Зберігати в оригінальному пакуванні виробника в затемнених, захищених від дії прямих сонячних променів, добре вентильованих приміщеннях при температурі від 1 до 20°C.

Термін придатності – 4 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення:

ТОВ “БРОВАФАРМА” м. Бровари,
б-р Незалежності 18 а, Київська обл., 07400

Виробник готового продукту:

ТОВ “БРОВАФАРМА” м. Бровари,
б-р Незалежності 18 а, Київська обл., 07400