

Листівка-вкладка

Додаток 2

UA

ФЛОКСИ-СПРЕЙ МАКС

Спрей для зовнішнього застосування	
Опис	Прозора рідина, безколірна або світло-жовтого кольору.
Склад	100 мл препарату містить діючі речовини: флуорфенікол 2,5 г; преднізолону ацетат 0,1 г; Допоміжні речовини: метилпіролідон, полівінілпіролідон, спирт етиловий, поліетиленгліколь, гліцерин, диметилсульфоксид.
Фармакологічні властивості	ATC vet класифікаційний код QD06 - антимікробні ветеринарні препарати для застосування в дерматології. QD07 - кортикостероїди для застосування в дерматології. ФЛОКСИ-СПРЕЙ МАКС - комплексний препарат з протимікробною, протизапальною, протиалергічною та протиекзудативною дією обумовленою впливом діючих речовин препарату: антибіотику флуорфеніколу, та глюкокортикоїду преднізолону. Флуорфенікол є похідним тіамфеніколу, в якому гідроксильна група заміщена атомом фтору, що обумовлює його антибактеріальну активність проти ацетилтрансферазосинтезуючих бактерій, чутливих до хлорамфеніколу. Флуорфенікол діє бактеріостатично на грампозитивні і грамнегативні бактерії, а саме: <i>Fusobacterium necrophorum</i>, <i>Bacteroides melaninogenicus</i>, <i>Streptococcus spp</i>, <i>Staphylococcus spp.</i>, <i>Pasteurella spp.</i>, <i>Salmonella spp.</i>, <i>Proteus</i>, <i>Pseudomonas</i>, <i>Haemophilus spp.</i>, а також <i>Mycoplasma spp.</i>, <i>Rickettsia spp.</i>, <i>Chlamydia</i>. Флуорфенікол пригнічує синтез білків у клітинах бактерій. В протоплазмі він зв'язується з 70S-рибосомними субодинаціями, пригнічуючи ферментну активність пептидилтрансферази, зменшуючи, такими чином, синтез білків в рибосомах відповідних бактерій. Преднізолон - синтетичний глюкокортикоїд що діє протизапально, протиалергічно та протиекзудативно. Протизапальна дія обумовлена пригніченням метаболізму арахідонової кислоти та вивільнення медіаторів запалення. При місцевому застосуванні відбувається абсорбція преднізолону і активна речовина потрапляє в кровотік. У плазмі 90% преднізолону знаходиться у зв'язаному вигляді (з транскортином і альбуміном). Біотрансформується шляхом окислення переважно у печінці; окислені форми глюкуронізуються або сульфатуються. Виводиться з сечею та калом у вигляді метаболітів, частково - в незміненому вигляді. Диметилсульфоксид у складі допоміжних речовин легко проникає через шкіру і слугує в якості переносника для забезпечення черезшкірної абсорбції діючих речовин препарату. Має місцевоанестезуючу, місцеву протизапальну, протимікробну (антисептичний) і фібринолітичну дію. Швидко і добре проникає через біологічні мембрани, у т.ч. через шкіру і слизові оболонки, підвищує їх проникність для інших лікарських засобів. Змінює чутливість мікрофлори, резистентної до антибіотиків.
Застосування	Собаки, коти: лікування тварин, хворих на дерматити бактеріального походження, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до флуорфеніколу, панарицій, піодермію, екзему, а також при травматичних та хірургічних ранах (у тому числі після кастрації), розчісуваннях, укусах, забоях, виразках і відкритих абсцесах.

Дозування	Перед нанесенням препарату уражену ділянку ретельно очищують від сторонніх тіл, ексудату, некротизованих тканин. Тримавши попередньо струшений флакон з препаратом на відстані 5-10 см від поверхні пошкодженої ділянки тіла, натискають на поршень розпилювача 1-2 рази і обробляють поверхню 5х5 см. Наносити препарат необхідно кожні 12 годин до повного заживлення ран у тварин.
Протипоказання	Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.
Застереження	Перед застосуванням флакон з препаратом необхідно струсити. Не допускати попадання препарату в очі та на слизової оболонки тварин. При небажаному потрапленні препарату на шкіру та слизові оболонки промити великою кількістю води. Перед застосуванням препарату з оброблюваних ділянок шкіри необхідно зістригти шерсть. Не дозволяти тварині впродовж 5 хвилин злизувати препарат. Препарат при застосуванні згідно рекомендацій листівки-вкладки не накопичується в продуктах тваринництва. У разі вимушеного забою тварини, оброблені ділянки необхідно видалити.
Форма випуску	Флакони з скломаси або полімерних матеріалів з пульверизатором по 30,0; 50,0; 100,0; 250,0; 500,0 мл.
Умови зберігання та транспортування	Темне, недоступне для дітей місце при температурі від 5°C до 25°C.
Термін придатності	2 роки при температурі від 5°C до 25°C.
Для застосування у ветеринарній медицині!	
Власник реєстраційного посвідчення	ТОВ "БІОТЕСТЛАБ" вул. Володимирська, буд. 57-А, м. Васильків, Київська обл., 08600, Україна
Виробники готового продукту	ТОВ "БІОТЕСТЛАБ" вул. Володимирська, буд. 57-А, м. Васильків, Київська обл., 08600, Україна