

### Листівка-вкладка

#### Назва ветеринарного препарату

Біокан L, Biocan L – вакцина інактивована проти лептоспірозу собак.

#### Склад

Одна доза (1 мл) вакцини містить:

Активні речовини:

*Leptospira icterohaemorrhagiae* інактивована мін. титр 32 за РМА\*

*Leptospira canicola* інактивована мін. титр 32 за РМА\*

*Leptospira grippotyphosa* інактивована мін. титр 32 за РМА\*

\* середнє геометричне значення титрів специфічних антитіл, визначених шляхом реакції мікроаглютинації

Допоміжні речовини:

ад'ювант: гідроксид алюмінію 1,8-2,2 мг

живильне середовище для культивування лептоспір.

#### Фармацевтична форма

Суспензія.

#### Імунобіологічні властивості

Після потрапляння в організм тварини антигени, що містяться у вакцині, розпізнаються як сторонні елементи, і в організмі активується ряд захисних механізмів (макрофаги, опсоніни, інтерлейкіни, В лімфоцити тощо), внаслідок чого починають формуватися антитіла, специфічні проти антигенних детермінант, що містяться у вакцині. Указані механізми повинні захищати від розвитку інфекції в разі зараження. Імунітет розвивається через 14 днів після первинної вакцинації, а стійкий імунітет формується через 14 днів після ревакцинації. Тварин, які були вакциновані, ревакцинують з інтервалом 14-21 день таким чином, щоб ревакцинація цуценят була зроблена у віці мінімум 12 тижнів. Для підтримання імунітету рекомендується щорічна ревакцинація.

Імунізацію краще проводити весною, зважаючи на те, що лептоспіри найбільш розповсюджені в кінці осені. Третє застосування вакцини рекомендується через 6 місяців після основної імунізації для собак, які перебувають на території, зараженій ендемічними лептоспірами, або якщо не можна уникнути контакту собаки з водою (плавання, пиття), тобто при підозрі на високий ризик інфікування.

#### Вид тварин

Собаки.

#### Показання до застосування

Для активної імунізації проти найбільш розповсюджених сероварів лептоспір у собак віком від 8 тижнів.

#### Протипоказання

Загальні гіпертермічні захворювання.

#### Застереження при застосуванні


Перед застосуванням вміст флакону підігріти до кімнатної температури (15-25)°C та ретельно збовтати.

Вакцинувати можна лише клінічно здорових тварин з хорошим ступенем вгодованості. Дегельмінтизацію слід проводити мінімум за 10 днів до вакцинації. Вакцинованих тварин не слід тренувати або піддавати фізичним навантаженням протягом одного тижня після вакцинації.

#### Взаємодія з іншими засобами

Вакцину Біокан L можна застосовувати окремо або одночасно з іншими вакцинами Біокан:

А) Вакцину Біокан L можна застосовувати в якості розчинника для інших ліофілізованих вакцин Біокан (наприклад Біокан DHPPi, Біокан DP, Біокан P).



Продовження додатку 2  
до реєстраційного посвідчення  
№ ВА-00111-02-09  
від 26.11.2014

В) Вакцину Біокан L можна застосовувати також в комбінації з рідкими вакцинами Біокан (Біокан С, Біокан В, Біокан М, Біокан R або навіть з ліофілізованою вакциною Біокан DHPPi).

#### **Особливі вказівки при вагітності, лактації**

Не вакцинувати протягом останніх 2 тижнів вагітності.

#### **Спосіб застосування та дози**

1 мл незалежно від маси та породи тварини.

Метод застосування – підшкірно.

Вакцину Біокан L слід застосовувати у віці від 8 тижнів, ревакцинацію слід проводити через 14-28 днів таким чином, щоб ревакцинація була зроблена у віці мінімум 12 тижнів. Для підтримання постійного імунітету слід проводити щорічну ревакцинацію.

#### **Рекомендована схема вакцинації:**

Схему вакцинації повинен визначати ветеринарний лікар в залежності від епізоотичної ситуації та рівня у вакцинованих тварин пасивного імунітету, отриманого через колостральні антитіла.

Для підтримання постійного імунітету у вакцинованих тварин рекомендується проводити щорічну ревакцинацію.

Вік пуценят	Умови щодо виникнення інфекції		
	Сприятливі	Несприятливі по парвовірусу	Несприятливі по чумі м'ясоїдних
5 – 6 тижнів		Puppy (P) + C	Puppy (DP) + C
7 – 8 тижнів		Puppy (P) + C	Puppy (DP) + C
8 – 10 тижнів	DHPPi + L	DHPPi + L	DHPPi + L
12 – 16 тижнів	DHPPi + LR	DHPPi + LR	DHPPi + LR
Щорічна ревакцинація	DHPPi + LR	DHPPi + LR	DHPPi + LR

#### **Примітки:**

Вакцини зазначені в дужках – можливість альтернативного застосування іншої вакцини замість вакцини Біокан Puppy.

Вакцини, позначені: +C, +L, +LR – можливість одночасного або комбінованого застосування з іншими вакцинами серії Біокан (DHPPi, DP, P, Puppy).

#### **Можливі вакцинації:**

Біокан М – вакцина проти *Microporum canis* для собак віком від 8 тижнів,

Біокан В – вакцина проти бореліозу для собак віком від 12 тижнів,

Біокан Т – вакцина проти правцю для собак віком від 12 тижнів.

#### **Побічні ефекти**

У місці застосування вакцини можуть з'явитися місцеві реакції (розміром з горошину), які зникають самі по собі протягом 3 тижнів. У рідких випадках можуть спостерігатися алергічні реакції.

#### **Період виведення (каренції)**

Не призначено для продуктивних тварин.

#### **Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, котрі застосовують ВП**

Дотримуватись правил роботи із ветеринарними препаратами.

#### **Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВП, способи його знешкодження і утилізації**

Будь-який невикористаний ветеринарний лікарський продукт або відходи, отримані від використання таких ветеринарних лікарських продуктів, слід утилізувати відповідно до місцевих вимог.

#### **Термін придатності**

2 роки. Вакцину з відкритого флакону необхідно використати одразу.

**Умови зберігання і транспортування**

Зберігати в сухому темному місці при температурі від 2°C до 8°C. Не заморожувати!

**Упаковка**

Пластикові коробки з 10 лунками: 10 x 1 мл вакцини Біокан L

Пластикові коробки з 20 лунками: 20 x 1 мл вакцини Біокан L

Пластикові коробки зі 50 лунками: 50 x 1 мл вакцини Біокан L

Пластикові коробки зі 100 лунками 100 x 1 мл вакцини Біокан L

**Правила відпуску**

За рецептом.

**Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення і виробника**

Акціонерне товариство «Біовета», Коменського 212, 683 23 Івановіце на Гане, Чеська республіка.

**Додаткова інформація**

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до «Вказівки про порядок пред'явлення рекламцій на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині» від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.

